



BANDERAS ROJAS TORÁCICAS

Fractura	Condiciones Neoplásicas	Trastornos Inflamatorios	Inflamatorio o Enfermedad Sistémica
- Traumático: traumatismo o lesión contundente. - Fracturas por compresión: raza caucasiana, antecedentes de tabaquismo, menopausia precoz, cuerpo delgado, modo de vida sedentario, tratamiento por esteroide, y consumo excesivo de cafeína o alcohol. - Dolor torácico agudo por tensión o traumatismo en los hombres o las mujeres > 60 años de edad.	- Edad > 50 años de edad. - Antecedentes de cáncer. - Pérdida de peso inexplicada. - Dolor constante, ningún alivio con la estancia en la cama. - Dolor nocturno.	- Espondilartritis anquilosante: extensión limitada del tórax, menos <2.5 cm medido sobre la línea del pezón. - Sacroileitis. - Dolor y rigidez matutina. - Afectación de las articulaciones periféricas. - HLA-B27 positivo	- Temperatura > 100° - Tensión arterial >160/95mmHg - Pulso al reposo > 100 pulsaciones. - Respiración de reposo > 25 ciclos. - Cansancio. - Osteomielitis, discitis, infección epidural, pericarditis.



Isquemia cardíaca	Disección de aneurisma torácico	Úlcera péptica	Colecistitis	Infección renal y cálculos renales
- Antecedentes de factores de riesgo para enfermedades coronarias, infarto del miocardio - Angina de pecho - Náusea	- Dolor súbito, severo y persistente de pecho que puede irradiar a la parte superior de la espalda. - Constante	- Dolor epigástrico irradiado al raquis torácico medio. - Desencadenada o aliviada por las comidas. - Antecedentes de utilización de NSAID. - La úlcera perforada puede producir un dolor referido al hombro con una irritación del diafragma.	- Dolor del cuadrante superior derecho y dolor escapular. Fiebre, náusea y vómito 1-2 horas después de comer grasas.	- Dolor del flanco/cólico renal. - Fiebre, náusea, y vómito. - Mayor riesgo de infección del riñón con infección del tracto urinario.