

BANDERAS ROJAS PARA DOLOR DE LA CADERA

François Ricard, D.O PhD



Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional



Banderas rojas para los pacientes con problemas pélvicos, de la cadera, o del muslo

Patología	Banderas rojas Datos obtenidos durante la anamnesis/antecedentes	Banderas rojas Datos obtenidos durante el examen físico
Cáncer del colon	Edad > 50 años Trastornos intestinales (por ejemplo, sangrado rectal, heces negras) Pérdida de peso inexplicada Antecedentes de cáncer del colon en la familia directa Dolor que no presenta características mecánicas	Etapas avanzadas: ruidos de hiperactividad intestinal o disminución de los ruidos por obstrucción. Sensibilidad palpatoria. Ascitis. Los primeros signos pueden ser metástasis del hígado, del pulmón, óseas, o del cerebro
Fracturas patológicas del cuello del fémur	Mujeres mayores (>70 años de edad) con dolor de la cadera, de la ingle, del muslo o de la rodilla Antecedentes de una caída a partir de la posición de pie	Dolor severo y constante, aumenta con el movimiento El miembro inferior está acortado y en rotación externa




Banderas rojas para los pacientes con problemas pélvicos, de la cadera, o del muslo

Osteonecrosis de la cabeza del fémur (o necrosis avascular)	Antecedentes de tratamiento a largo plazo con corticoesteroides. Antecedentes de necrosis avasculares de la cadera contralateral. Traumatismo	Principio progresivo del dolor; puede referirse a la ingle, al muslo, o a la parte interna de la rodilla; aumenta con la puesta en carga Rigidez de la articulación de la cadera; restricciones principalmente en rotación interna, flexión, aducción
Enfermedad de Legg - Perthes - Calvé	Niños de 5-8 años de edad con dolor de la ingle o del muslo	Marcha antálgica Dolor empeorado por los movimientos de la cadera, especialmente la abducción de cadera y la rotación interna
Epifisiolisis femoral superior (Deslizamiento epifisario)	Adolescente de peso excesivo Recientes antecedentes de pico de crecimiento o de traumatismo.	Dolor de la ingle empeorado por la puesta en carga MI en rotación externa Limitaciones de la RI de cadera
Artritis séptica de la cadera	Niño o adulto mayor con dolor de la cadera después de una reciente infección bacteriana	Evitación del apoyo o al movimiento de la cadera involucrada

Banderas rojas para los pacientes con problemas pélvicos, de la cadera, o del muslo

Apendicitis	Dolor del cuadrante inferior derecho del abdomen acompañado de náusea y vómito El apéndice retrocecal puede causar un dolor del muslo o del testículo derecho	Rigidez abdominal, sensibilidad al rebote Punto de Mac Burney positivo Signo positivo del psoas y del obturador
Quiste ovárico	Mujer en edad fértil Dolor abdominal o pelviano súbito y severo Menstruaciones irregulares y dolorosas	





Visita Nuestro Departamento Científico

scientific-european-federation-osteopaths.org