

PATOLOGÍA DEGENERATIVA

Autor: François Ricard, D.O PhD




Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional



PATOLOGÍA DEGENERATIVA DISCAL


Autor: François Ricard, D.O PhD




Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional




DOLOR REFERIDO DISCAL




VARIACIONES DE LA PRESIÓN DISCAL CERVICAL SEGÚN LA POSICIÓN



DOLORES REFERIDOS CAPSULOLIGAMENTARIOS



DOLORES REFERIDOS A PARTIR DE LOS LIGAMENTOS INTERESPINOSOS



SIGNOS RADIOLOGÍCOS DE HERNIA DISCAL



Bostezo lateral izquierdo
C6 -C7



Bostezo posterior C5
- C6

HERNIA DISCAL



PROTRUSIÓN DISCAL C4-C5 Y HERNIA DISCAL EXTRUIDA C5-C6



© Rauschnig - Jónsson

HERNIA DISCAL


La compresión por hernia discal puede producir irritación de la médula o de la raíz nerviosa :

- Síntomas en relación con la raíz nerviosa: neuralgia unilateral con parestesias, hormigueos, posibles trastornos motores periféricos.




HERNIA DISCAL

-Síntomas en relación con la compresión medular: neuralgia bilateral con parestesias, hormigueos, posibles trastornos motores periféricos y/o centrales.




REPERCUSIONES DE UNA TRACCIÓN SOBRE EL NERVIO



CERVICOARTROSIS


Autor: François Ricard, D.O PhD




Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional




CERVICOARTROSIS




DISCARTROSIS CON PÉRDIDA DE LA LORDOSIS CERVICAL



CERVICARTROSIS Y PÉRDIDA DE LORDOSIS.



CERVICOARTROSIS




CERVICOARTROSIS




La estenosis artrósica provoca una radiculalgia unilateral con parestesias, hormigueos, posibles trastornos motores periféricos.


CERVICOARTROSIS





CERVICOARTROSIS




UNCOARTROSIS C5




CERVICOARTROSIS



CERVICOARTROSIS Y ESTENOSIS FORAMINAL




Repercusión de una rotación izquierda sobre el agujero de conjunción en caso de osteofitosis uncovertebral izquierda.



Repercusión de una rotación derecha sobre el agujero de conjunción en caso de osteofitosis de la carilla articular izquierda.

CERVICOARTROSIS



Las radiografías oblicuas son indispensables para determinar el tipo de manipulación cervical adecuada.

CERVICOARTROSIS Y ESTENOSIS FORAMINAL



SÍNDROME DE BARRE LIOU SÍNDROME SIMPÁTICO-CERVICAL POSTERIOR

Es una irritación del sistema periarterial debido a una uncoartrosis, sobre un terreno de insuficiencia vértebro-basilar.



SÍNDROME DE BARRE LIOU SÍNDROME SIMPÁTICO-CERVICAL POSTERIOR

El cuadro clínico presenta:

- Cefaleas, a menudo bilaterales, en las regiones frontales, orbitales, temporales o cérvico-occipitales.
- El dolor se exagera con el movimiento.
- Vértigos o sensación de inestabilidad.
- Zumbidos y taponamiento de oídos.



SÍNDROME DE BARRE LIOU SÍNDROME SIMPÁTICO-CERVICAL POSTERIOR

- Trastornos visuales de tipo destellos o moscas.
- Trastornos de laringe.
- Dolores cervicales importantes en lateroflexión, y posibles N.C.B..
- Puede haber manifestaciones psicósomáticas tipo ansiedad, angustia, insomnio, etc.



SÍNDROME DE BARRE-LIOU Y MANIPULACIONES




EL SÍNDROME DE BARRE-LIOU ES UNA CONTRA INDICACION
FORMAL A LA UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE THRUST A
NIVEL CERVICAL

COMPRESIÓN POR OSTEOFITOSIS POSTERIOR



MECANISMOS DE LAS RADICULALGIAS POR COMPRESIÓN





Visita nuestro departamento clínico

CLASES PRACTICAS

www.clinicaeom.com