


PATOLOGÍA MUSCULAR

François Ricard, D.O PhD



Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional



Es necesaria la evaluación de los grupos musculares que pueden estar involucrados en las disfunciones costales, para hacer un buen diagnóstico diferencial




OBLICUOS DEL ABDOMEN


MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN
OBLICUO MAYOR N. Intercostales (8-12) Abdominogenital mayor Abdominogenital menor	a) 8 digitaciones, de la superficie externa y los bordes inferiores de las últimas 8 costillas	a) Mitad anterior de la cresta ilíaca b) Por medio de la aponeurosis, en el tubérculo púbico y la línea pectínea en la parte media, se entrelaza con la aponeurosis del músculo opuesto formando la línea blanca, que se extiende desde la apófisis xifoides hasta la sínfisis del pubis
OBLICUO MENOR N. Intercostales (8-12) ramas del nervio abdominogenital menor y a veces del abdominogenital mayor	a) Mitad externa de la cara superior del arco crural b) 2/3 anteriores de la cresta ilíaca c) hoja posterior de la aponeurosis dorsolumbar	a) Cresta del pubis y parte interna de la línea pectínea b) La línea blanca c) Cartílagos de la 7ª, 8ª y 9ª costillas d) Bordes inferiores de los cartílagos de las 3 últimas costillas



DOLORES REFERIDOS DE LOS OBLICUOS DEL ABDOMEN



DOLORES REFERIDOS DE LOS OBLICUOS DEL ABDOMEN




RECTO MAYOR DEL ABDOMEN


MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN
Recto mayor del Abdomen N. nervios intercostales (7-12)	a) Cresta del pubis b) Ligamentos que cubren el frente de la sínfisis púbica	En 3 partes se fija en los cartílagos de 5ª, 6ª y 7ª costillas




DOLORES REFERIDOS DEL RECTO ANTERIOR DEL ABDOMEN



DOLORES REFERIDOS DEL RECTO ANTERIOR DEL ABDOMEN




DOLORES REFERIDOS DE LOS INTERCOSTALES





SERRATO MAYOR

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN
SERRATO MAYOR N. ramo propio del plexo braquial (C5, C6 y C7)	Fascículos de la cara externa y borde superior de las primeras 8 o 9 costillas	a) Cara anterior del ángulo superior. b) Cara anterior del borde vertebral del omóplato. c) Los 5 o 6 fascículos inferiores se reúnen e insertan en la cara anterior del ángulo inferior del omóplato.





DOLORES REFERIDOS DEL SERRATO MAYOR

DOLORES REFERIDOS DEL PECTORAL MAYOR



DOLORES REFERIDOS DEL PECTORAL MAYOR





Visita nuestro departamento científico

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO
E INNOVACIÓN

scientific-european-federation-osteopaths.org

