

# DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PRIMERA COSTILLA

---



# DESFILADEROS COSTO-CLAVICULARES




- El desfiladero costo-clavicular por sí mismo no produce compresiones más que en el 20 %, durante la hiperabducción.


# ARTROSIS 1ª COSTILLA




# COSTILLA CERVICAL




# MEGA TRANSVERSA C7 Y COSTILLA CERVICAL







- Costilla C7 que comprime la arteria subclavia: se produce una dilatación post-estenosis.




- Compresión de la arteria subclavia por costilla cervical y banda fibrosa.

# RELACIONES T1 / 1a. COSTILLA




- T1 describe un bucle en “S” alrededor de la 1ª costilla. La raíz proviene de abajo, de atrás y de adentro; asciende oblicuamente hacia la cara superior de la 1a. Costilla, y luego se dirige oblicuamente hacia abajo y afuera.


# LIGAMENTO COSTO-SEPTO-COSTAL.OJAL DE T1



El ligamento costo-septo-costal puede comprimir T1.





# MEMBRANA SUPRAPLEURAL




La membrana suprapleural puede ser otro elemento de compresión.

# LIGAMENTOS SUPRAPLEURALES



Los ligamentos costo y vertebro-pleurales pueden comprimir la raíz T1.

# LIGAMENTO COSTO-SEPTO-COSTAL




Derecha : Vista Superior.




Derecha : Vista Inferior.


# LIGAMENTO COSTO-SEPTO-COSTAL




El ligamento costo-septo-costal puede ser una factor de compresión de T1.



# LIGAMENTO TRANSVERSO-SEPTO-COSTAL




\* Escaleno Mínimo adosado o reemplazando al Ligamento.



El ligamento transverso-septo-costal puede ser una factor de compresión de T1.


1ª costilla rudimentaria  
fijada al plexobraquial




La costilla cervical habitualmente no produce síntomas

Compresión del plexo braquial por una costilla en C7.

*Ramas alta del plexo braquial  
puesta en tensión por una costilla  
cervical.*





- La costilla cervical se adhiere a la 1ª costilla por una lámina fibrosa.



- 1ª costilla comprime la arteria subclavia.

# MEGA TRANSVERSA C7




Medida para determinar si existe una mega apófisis transversa C7.

# MEGA TRANSVERSA C7 Y COSTILLA CERVICAL



# TRASTORNOS POSTURALES Y SÍNDROMES DE LOS DESFILADEROS ESCAPULO-TORÁCICOS



En estos síndromes, no sólo existen las posibles malformaciones congénitas que son importantes, si no también las modificaciones de la postura: el desequilibrio postural anteroposterior o lateral es generador de trastornos.



# Visita nuestro departamento científico

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO  
E INNOVACIÓN

[scientific-european-federation-osteopaths.org](http://scientific-european-federation-osteopaths.org)

