



MORFOLOGÍA PALPATORIA DE LA PELVIS






1. Cresta ilíaca.
2. Espinosa de S2.
3. EIPS.
4. EIPI.
5. AIL
6. Isquion

MORFOLOGÍA PALPATORIA LUMBAR




Palpación del espacio intervertebral de L4 y L5. Este espacio se encuentra al mismo nivel que la partes más alta de las crestas ilíacas.




La apófisis espinosa de S2 se encuentra en la parte central de una línea trazada entre las espinas ilíacas posteriores y superiores.

PALPACIÓN DE LAS CRESTAS ILÍACAS




PALPACIÓN DEL TROCÁNTER MAYOR EN BIPEDESTACIÓN







Palpación de la cresta
ilíaca.




Palpación de la EIAS.

PALPACIÓN DE LA PELVIS EN LATEROCÚBITO





Palpación del isquion.



Palpación del trocánter mayor.

PALPACIÓN DE LAS EIPS



PALPACIÓN DE LOS SULCOS (BASES SACRAS)



PALPACIÓN DE LOS AIL



Palpación en sentido
postero-anterior



Palpación en sentido
caudo-craneal

PALPACIÓN DE LOS ISQUIONES



PALPACIÓN DE LAS RAMAS PÚBLICAS





**Visita nuestro
departamento clínico**

CLASES PRACTICAS

www.clinicaeom.com