



DISFUNCIÓN EN UP-SLIP DEL ILÍACO



SIGNOS CLÍNICOS EN CASO DE DISFUNCIÓN UP-SLIP



1. Cresta ilíaca más alta.
2. EIPS más alta.
3. Ascenso del ilíaco.
4. Ascenso de la cabeza femoral .
5. Ascenso del isquion.
6. Pierna corta homolateral.


RESALTAR EL ORIGEN TRAUMÁTICO DE ESTA
DISFUNCIÓN

REFERENCIAS PALPATORIAS

REFERENCIA	POSTERIOR	ANTERIOR	IN-FLARE OUT-FLARE		UP-SLIP
Pierna	Corta	Larga	Normal	Normal	Corta
EIPS	Posteroinferior	Antero superior	Acercadas y al mismo nivel	Separadas y al mismo nivel	Alta
EIAS	Posterosuperior	Antero inferior	Acercadas y al mismo nivel	Separadas y al mismo nivel	Alta
Sulcus	Profundo	Borrado	Ancho	Estrecho	Profundo
Rama Púlica	Dolorosa a la palpación	Dolorosa a la palpación	Dolorosa a la compresión	Dolorosa a la separación	Dolorosa a la palpación
Tuberosidad isquiática	Anterior	Posterior	Separadas pero al mismo nivel	Acercadas pero al mismo nivel	Alta



MÚSCULOS QUE FIJAN LA DISFUNCIÓN UP-SLIP



TUG TÉCNICA PARA ILÍACO UP-SLIP





Visita nuestro departamento científico

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO
E INNOVACIÓN

scientific-european-federation-osteopaths.org

