


BANDERAS ROJAS PARA DOLOR MUÑECA Y MANO

Autor: François Ricard



INFECCIONES

- Calor
- Tumefacción
- Dolor
- Rubor
- Inflamación



FRACTURA / LUXACIÓN

5 principales resultados físicos más útiles en la búsqueda de una fractura de muñeca.

- Sensibilidad localizada (Sensibilidad 94%)
- Dolor al movimiento activo (Sensibilidad 97%)
- Dolor al movimiento pasivo (Sensibilidad 94%)
- Dolor a los esfuerzos con puño cerrado o al hacer fuerza con la mano (Sensibilidad 71%)
- Dolor a la supinación (Sensibilidad 68%)



Nervio mediano



Parte superior del brazo



Muñeca

Nervio radial



Parte superior del brazo



Radio distal



Tabaquera anatómica

Nervio cubital



Parte superior del brazo




Canal olecraneano-cubital

BANDERAS ROJAS PARA DOLOR MUÑECA Y MANO

Para reproducir los síntomas, si se sospecha un diagnóstico de compresión nerviosa periférica, la reacción positiva es el aumento del dolor o diferencias en los síntomas comparando con lado sano.

Buena fiabilidad (Kappa =.593)





Visita Nuestro Departamento Científico

scientific-european-federation-osteopaths.org