

DIAGNÓSTICO OSTEOPÁTICO DE LAS DISFUNCIONES SOMÁTICAS DE LA MUÑECA

Autor: François Ricard



Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional



LOS CINCO SIGNOS DE DISFUNCIONES DE LOS HUESOS DEL CARPO

1. El hueso doloroso puede ser el hipermóvil: duele a la palpación pero está libre a los test de movilidad.
2. La hipomovilidad también puede generar dolor (sobre todo a la sollicitación mecánica). Esta hipomovilidad puede darse en parámetros de extensión o flexión.




LOS CINCO SIGNOS DE DISFUNCIONES DE LOS HUESOS DEL CARPO

3. Si la disfunción es en EXTENSIÓN (anterior), puede existir una restricción / dolor en flexión y una sensación de hueco en la cara dorsal de la muñeca.
4. Si la disfunción es en FLEXIÓN (posterior), puede existir una restricción/ dolor en extensión y una sensación de resalte en la cara dorsal de la muñeca.
5. Un dolor en la muñeca, por interdependencia regional, puede tener su origen en otras estructuras.



PRINCIPIO DEL TEST DE MOVILIDAD

DISFUNCIÓN SOMÁTICA EN EXTENSIÓN



EXTENSIÓN DE LA MUÑECA

Estudio	Sensibilidad	Especificad	LR+	LR-	QUADAS (0-14)
Unay et al.	72	60	1,81	0,46	11



INSPECCIÓN DE LA MOVILIDAD ACTIVA

FLEXIÓN DE LA MUÑECA

Estudio	Sensibilidad	Especificad	LR+	LR-	QUADAS (0-14)
Unay et al.	71	50	1,43	0,57	11



TEST DE MOVILIDAD EN INCLINACIÓN RADIAL

Estudio	Sensibilidad	Especificad	LR+	LR-	QUADAS (0-14)
Unay et al.	68	33	1,03	0,95	1 1



TEST DE MOVILIDAD EN INCLINACIÓN CUBITAL


Estudio	Sensibilidad	Especificad	LR+	LR-	QUADAS (0-14)
Unay et al.	70	36	1,10	0,83	11



TEST DE MOVILIDAD EN DESLIZAMIENTO ANTERO POSTERIOR



Kappa, sensibilidad y especificad desconocidas.



Visita Nuestro Departamento Científico

scientific-european-federation-osteopaths.org