




**Escuela Osteopatía
de Madrid** *Internacional*

BANDERAS ROJAS PARA EL TRATAMIENTO DEL BAZO

Germán Mejías López. PT, DO, MSc.



BANDERAS ROJAS PARA TRATAMIENTO DEL BAZO.

- **Esplenomegalia sensible o patológica.**
- Bazo agrandado por causas inflamatorias o infecciosas (p. ej., esplenitis, leucemias).
- Riesgo de ruptura o hemorragia interna.
- **Infección aguda o absceso esplénico.**
- Empeoramiento del proceso infeccioso o riesgo de diseminación si se interviene manualmente.
- **Trauma abdominal reciente.**
- Riesgo elevado de ruptura esplénica o lesión interna que puede desatar una emergencia quirúrgica.
- **Malignidad o enfermedades sistémicas.**
- Enfermedades como linfoma, leucemia u otras neoplasias que afecten al bazo o estructura adyacente: contraindicación debido al riesgo de diseminación o alteración de tejido.

BANDERAS ROJAS PARA TRATAMIENTO DEL BAZO.

- **Coagulopatías o tratamiento anticoagulante.**
- Pacientes con trastornos de coagulación o bajo anticoagulación, con alto riesgo de hematoma interno tras manipulación.

BANDERAS ROJAS PARA TRATAMIENTO DEL BAZO

.

¿Qué debe hacer un osteópata si identifica una bandera roja?

1. Detener el tratamiento inmediato.
2. Derivar al paciente a un médico o centro de salud.
3. Registrar la información detalladamente y documentar la derivación

BIBLIOGRAFÍA.

- **Indications and contraindications of osteopathic treatment – CADAN (School of Osteopathy)**
Recurso clínico que explica en detalle las contraindicaciones absolutas y relativas en osteopatía, según el tipo de técnica. Fundamental para justificar decisiones clínicas seguras ante el tratamiento del bazo.
- R. J. Hruby and E. S. Martinez.**The Lymphatic System: An Osteopathic Review.** Cureus. 2021 Jul 17;13(7).