



**Escuela Osteopatía
de Madrid** *Internacional*

Visceral IV: Sistema Linfático

Juan A. Díaz Mancha PhD

2.ª edición

ALORACIÓN MANUAL



2.ª edición


Valoración manual



Juan Antonio Díaz Mancha

Pruebas para valorar el sistema linfático

- [Prueba de Glénard](#)
- [Signo de Saegesser](#)



En la fecha de publicación de esta edición, no existen, en el conocimiento de los autores, estudios que hayan aportado datos sobre evidencia científica de esta prueba.

Prueba de Glénard

Esta prueba se utiliza para valorar la existencia de una ptosis del bazo, esto es, una esplacnoptosis.

Posición del paciente

En bipedestación, con los brazos a lo largo del cuerpo.

Posición del terapeuta


En bipedestación, a la espalda del paciente en finta doble orientado hacia este.

Ejecución del test

El terapeuta rodea con sus dos brazos al paciente y abarca con el borde cubital de las manos la parte baja de su abdomen, de tal forma que las manos del terapeuta se encuentren entre los brazos y el abdomen del paciente. En esta posición, introduce los contactos profundamente en el abdomen, abarcando las vísceras. A continuación lleva a cabo una tracción craneal del conjunto visceral. Al final las suelta de forma repentina.

Interpretación del test

Si al realizar la tracción craneal de las vísceras del paciente el terapeuta siente una mejoría de la sintomatología dolorosa pero cuando las suelta de forma repentina percibe un empeoramiento de aquella, se puede pensar en la existencia de una esplacnoptosis. En este caso se considera que la prueba es positiva.



En la fecha de publicación de esta edición, no existen, en el conocimiento de los autores, estudios que hayan aportado datos sobre evidencia científica de esta prueba.

Signo de Saegesser

Esta prueba se utiliza para evaluar la existencia de una posible rotura esplénica.

Posición del paciente

En decúbito supino, con los brazos a lo largo del cuerpo y las rodillas extendidas.

Posición del terapeuta

En bipedestación, en el lado derecho del paciente a la altura del cuello en finta doble orientado hacia este.

Ejecución del test

El terapeuta contacta con la yema de los dedos índice y corazón de la mano inferior sobre un punto situado entre las fibras de los músculos esternocleidomastoideo y escalenos del lado izquierdo. Acto seguido realiza una pequeña compresión.

Interpretación del test

Si al llevar a cabo la acción el terapeuta aparece un cuadro álgico agudo y súbito en el abdomen del paciente a la altura del bazo, se puede pensar en la existencia de una rotura esplénica.

Evidencia científica

En la fecha de publicación de esta edición, no existen, en el conocimiento de los autores, estudios que hayan aportado datos sobre la evidencia científica de esta prueba.



**Escuela Osteopatía
de Madrid** *Internacional*

¡Gracias!

Síguenos en redes



eominternacional.com | escuelaosteopatiamadrid.com