

PATOLOGÍA INFLAMATORIA DEL OÍDO MEDIO

Dr. Francois Ricard



Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional



ALTERACIONES DE LA VENTILACIÓN: OTITIS SECRETORA (OTITIS MEDIA CON DERRAME, OTITIS MEDIA SEROSA, OTITIS CATARRAL)

1. FISIOPATOLOGÍA:

- Obstrucciones mecánicas o funcionales de la trompa de Eustaquio.
- El cierre tubárico produce :
 - Metaplasia de las células epiteliales del mucoperiostio del oído medio, que se convierten en células prismáticas ciliadas y secretoras de moco.
 - Aumento de la actividad secretora de las células caliciformes .
 - Formación de quistes mucosos con colesterol.



- La ventilación del oído medio alterada por la trompa de Eustaquio cuando la porción superior contiene líquido debido a otitis media.
- Anomalías del trayecto o inserción de los músculos palatinos.
- Anomalías de forma del cartílago de la trompa de Eustaquio .
- En paladar hundido, la porción de la trompa no se abre en su totalidad debido a un defecto de sincronización muscular o bien porque el orificio se encuentra parcialmente cerrado por el músculo periestafilino interno durante la deglución, presentando una situación más lateral.



2. DIAGNÓSTICO:

➤ MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La obstrucción tubárica provoca:

- Sensación subjetiva de presión en el oído.
- Hipoacusia (es el síntoma de presentación más común).
- Otolgia ocasional y chasquidos durante la deglución.



➤ OTOSCOPIA:

- Tímpano retraído.
- Congestión de los vasos timpánicos y del mango del martillo.
- Nivel hidroaéreo transtimpánico.



3. TRATAMIENTO MÉDICO:


- Vasoconstrictores, antihistamínicos para reducir la hiperemia y el edema tubárico en la rinofaringitis de etiología alérgica.
- Antibióticos, descongestivos.
- Tratamiento de alergia con inmunización.



SÍNDROME DE LA TROMPA INSUFICIENTE O DE LA TROMPA ABIERTA

- Insuficiencia del mecanismo del cierre tubárico por atrofia de los músculos nasofaríngeos (ictus cerebral, poliomielitis, parkinsonismo).
- Atrofia del tejido graso a nivel del orificio tubárico producido por alteraciones hormonales, anticonceptivos o por un rápido adelgazamiento.
- Produce autofonía (resonancia de la propia voz), así como percepción de los ruidos respiratorios.





Visita Nuestro Departamento Científico

scientific-european-federation-osteopaths.org