

SECUELAS Y COMPLICACIONES DE LAS OTITIS

Dr. Francois Ricard



Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional



SECUELAS Y COMPLICACIONES DE LAS OTITIS




Imagen de una otitis adhesiva en la que la membrana timpánica se ha retraído sobre el contenido de la caja del tímpano (véase pliego de color).

SECUELAS Y COMPLICACIONES DE LAS OTITIS

1. OTITIS ADHESIVA:

- Fibrosis cicatricial en la caja timpánica, del proceso inflamatorio prolongado.
- Produce una hipoacusia conductiva de grado variable.
- La otoscopia muestra un tímpano íntegro, retraído o adherido al promontorio, con engrosamiento cicatricial.



2. TIMPANOESCLEROSIS Y TIMPANOFOBROSIS:

- Es una secuela cicatricial que se caracteriza por degeneración hialina de las fibras elásticas de la lámina propia de la membrana timpánica y de la mucosa del oído medio, con calcificación secundaria .
- Patogenicamente un estímulo irritativo (cuadros catarrales, punciones de la membrana timpánica o infecciones) produce una inflamación que ocasiona:
 - una despoblación celular con una falta de aporte vascular seguida de una hialinosis de la mucosa y del hueso,
 - depósito de calcio,
 - erosión y osificación.



2. TIMPANOESCLEROSIS Y TIMPANOFOBROSIS:

- Cuando se localiza en la membrana timpánica, se denomina miringoesclerosis, y cuando se afecta la caja del tímpano y mastoides, timpanoesclerosis.
- Recientemente se ha postulado un mecanismo inmunitario en la etiopatogénesis.



3. GRANULOTITIS MEDIA AGUDA DE COLESTEROL:


- Es una entidad inespecífica que ocurre en cualquier tipo de otitis media crónica.
- Es secundario a edema de la mucosa, exudación y hemorragia. Consiste en un tejido de granulación azulado en cuyo interior existen cristales de colesterol rodeados por células gigantes de cuerpo extraño.



3. GRANULOTITIS MEDIA AGUDA DE COLESTEROL:

- Su origen radica en la extravasación hemática a partir de los vasos de la mucosa enferma en un ambiente con presiones negativas.
- Los procesos de degradación de la hemoglobina son responsables del cuadro histológico típico.
- Requiere un abordaje quirúrgico para su eliminación y conseguir una buena ventilación de la caja.





Visita Nuestro Departamento Científico

scientific-european-federation-osteopaths.org