

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL del PANCREAS

Patologías orgánicas:

- ✓ Pancreatitis aguda.
- ✓ Pancreatitis crónica.
- ✓ Carcinoma de páncreas.

1. Pancreatitis aguda:

- ✓ Es una inflamación aguda que afecta al páncreas y a sus alrededores.
- ✓ Puede dar lugar a una *ascitis* (cantidades grandes de líquido rico en enzima que se forma en la cavidad abdominal).

- ✓ **ETIOLOGÍA:**

- > En muchas ocasiones la etiología es idiopática.
- > En ocasiones es debida a cálculos en la vesícula biliar.
- > Consumo excesivo de alcohol.
- > Paperas.
- > Trauma quirúrgico.
- > Terapia con esteroides.
- > Terapia diurética.
- > Hiperlipidemia.
- > Obstrucción del conducto pancreático por cálculo o tumor.

- ✓ **SINTOMAS:** Los signos pueden ser relativamente poco uniformes en el caso de enfermedad seria. El aspecto de "moratones" que parecen alrededor del ombligo o en los flancos (una reflexión del proceso hemorrágico interno) implicaría una enfermedad muy seria. Un análisis de sangre que muestre un alto nivel de amilasa es sugestivo de pancreatitis:

- > Dolor abdominal central que se irradia a la parte posterior del tronco con vómitos que se asocian a grados variables de dolor abdominal.
- > Dolor epigástrico o abdominal irradiado a los flancos.
- > Náuseas y vómitos.
- > Fiebre y sudor.
- > Taquicardia.
- > Mal estar, ictericia.
- > Posición antálgica en Z.

> Puede entrar en estado de shock.

✓ **TRATAMIENTO:**

- > Acudir al hospital.
- > Corrección urgente del shock con líquidos intravenosos.
- > Nada por vía oral, evitar activar el proceso digestivo.
- > Antálgicos.



2. **Pancreatitis crónica:**

✓ **ETIOLOGÍA:**

- > Alcoholismo
- > Síndrome de mal absorción intestinal.
- > Hiperparatiroidismo.


✓ **SINTOMAS:**

- > Salud deficiente de manera prolongada.
- > Dolor recurrente abdominal central con irradiación a la parte posterior del tronco.
- > Esteatorrea (heces grasas).

- > Diabetes.
- > Dolor epigástrico ó abdominal irradiado a los flancos.
- > Dolor lumbar superior izquierdo.
- > Náuseas y vómitos.
- > Estreñimiento.
- > Flatulencia.
- > Pérdida de peso.

✓ **TRATAMIENTO:**

- > Suplementos de enzimas pancreáticas.
- > Dieta baja en grasa.
- > Evitar comidas copiosas.
- > Evitar el consumo de alcohol.
- > Suplementos de vitaminas.



3. **Carcinoma de páncreas:**

- ✓ La incidencia de cáncer de páncreas en los países desarrollados esta aumentando de forma muy clara, asociado a personas con habito al tabaco y patologías como la diabetes, encontrando el corte de edad entre 50 y 60 años.
- ✓ El 80 % de los casos de cáncer de páncreas son adenocarcinomas y los 2/3 del total de casos se localizan topográficamente en la cabeza del páncreas.
- ✓ Son difíciles de evidenciar y su extensión local puede llegar a afectar a estructuras vecinas como el canal hepático común, pudiendo producir ictericia.
- ✓ Se dan metástasis en el hígado y en los ganglios linfáticos de forma rápida.

✓ **SINTOMAS:**


- > Pérdida de peso.
- > Dolor epigástrico, aliviado en sedestación con el tronco inclinado hacia delante.
- > Dolor epigástrico ó abdominal irradiado a los flancos; Y en ocasiones un dolor lumbar puede ser el único síntoma.
- > Ictericia.
- > Esteatorrea (heces grasas).
- > Diabetes de inicio repentino.
- > Trombosis espontanea migratoria de las venas periféricas.
- > En ocasiones el único síntoma puede ser un episodio de pancreatitis aguda.
- > Debido a que el páncreas es retroperitoneal los síntomas son casi siempre vagos, lo cual retrasa el diagnostico y por tanto es peor el pronóstico.
- > Sera +++ el marcador para cáncer de páncreas: CA 19-9 (Antígeno de carbohidratos).

✓ **TRATAMIENTO:**

- > Aliviar los síntomas.
- > Si la quimioterapia es eficaz, entonces la cirugía de ablación de la parte afectada del páncreas puede dar al paciente uno o dos años de vida.

✓ *PRONOSTICO:*

> La supervivencia de 5 años es del 2%.



ADENOCARCINOMA
DE PANCREAS

Bibliografía: François Ricard. Tratado de osteopatía visceral y medicina interna osteopática : tomo 2: sistema digestivo. Panamericana 2008.