

COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA DE ESPALDA

Fracasos de la cirugía lumbar para la hernia discal

1) FUSIÓN VERTEBRAL

- Problema mayor pseudartrosis
- GREENENOUGH - 135 pacientes – Buenos resultados 65%, Fracaso 35%.

2) INJERTOS TORNILLO- PLACAS, PROTESIS DISCAL:

- Problema mayor inestabilidad
- YUAN metaanálisis 2.121 pacientes -0,3% inestabilidad ¿?%

a) CAJA:

- Problema de inestabilidad (formación osteofitos locales) ¿?%

b) PROTESIS DISCAL :

- Problema de inestabilidad o rotura (producción estenosis raquídea) ¿?%

3) INFECCIÓN POSTQUIRÚRGICA

- 20 a 32% (50 a 87,5% tiene una muy mala recuperación).

4) FIBROSIS POSQUIRURGICA

- Problema de estenosis raquídea (10 a 75%).

5) RADICULITIS ESTERIL

- 20% a 6 semanas, 2% a 6 meses.

6) ARACNOIDITIS ESTERIL

- 6 a 16 %.

LIBROS DE REFERENCIA:

- François Ricard. Tratamiento osteopático de las lumbalgias y lumbociáticas por hernias discales. Ed. Medos; Madrid 2013.