

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO: TRATAMIENTO NEUROVEGETATIVO

¿QUE TRATAMIENTO OSTEOPATICO UTILIZAR PARA REEQUILIBRAR EL SISTEMA NEUROVEGETATIVO?

El principio básico es eliminar la **irritación músculo-esquelética, visceral y craneal** que permite suprimir toda **SENSIBILIZACIÓN NERVIOSA** para permitir la reequilibración homeostática del **SNV**.

Es preciso centrarse en tratar la **METÁMERA** y los órganos en disfunciones.

El tratamiento del trayecto del **X- NEUMOGÁSTRICO** es esencial.

El diagnóstico con **TEST, POLAR H10, APP ELITE HRV y SOFTWARE KUBIOS HRV Standard** nos permite determinar el **ESTADO NEUROVEGETATIVO** del paciente y verificar la eficacia de nuestro tratamiento de manera objetivable.

La meta del tratamiento no es tanto estimular el ortosimpático o el parasimpático, pero más bien **suprimir los focos de irritación del cuerpo para que el SNV pueda normalizarse**.

– **MÚSCULOESQUELETICO (HVT, etc.):**

- Modifican el flujo sanguíneo cutáneo → sistema simpático (karason y drysdale et al., 2003).
- Cambio significativo en el sistema nervioso → región suboccipital → cambios en sistema nervioso (rechberger et al, 2019).
- Acción normalizadora ortosimpática (suprimen la sensibilización medular).
- Secreción cortisol → modifica la inhibición parasimpática y la prevalencia simpática (Fornari et al., 2017).
- A nivel torácico → componente simpático del dolor (Kingston et al., 2014). También en el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, en el dolor y la modulación de los procesos endocrinos y fisiológicos neurovegetativos (Kovanur Sampath et al., 2015).
- Metabolismo cerebral regional de la glucosa relacionado con la relajación simpática y la reducción del dolor (Ogura et al, 2011).
- Respuesta simpático-excitatoria durante el período de intervención con la técnica de manipulación (perry et al., 2015).
- Reflejos somatoviscerales (sato, 1992).
- Toggle recoil → desordenes funcionales parasimpaticotonicos de las vísceras craneales o en los parasimpaticotonías → acción simpaticotonica
- **CV4** → ↗ actividad parasimpática y ↘ la actividad simpática, restablece el equilibrio simpático-vagal (Curi et al., 2018).
- **SEB** → eje hipotálamo-hipofisario, eje principal del funcionamiento neurovegetativo. compresión de la SEB implica una parasimpaticotonía general por inhibición del ortosimpático.
- **Liberación miofascial** → el tono del sistema nervioso autónomo por acción parasimpática (Henley et al., 2008) → Unwinding.
- **Liberar el X** → agujero rasgado posterior, cervicales, tórax visceral (corazón++, cruce aortico-traqueo-esofágico, diafragma, sistema visceral).



SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO: TRATAMIENTO NEUROVEGETATIVO



ESCUELA DE OSTEOPATÍA DE MADRID



ESCUELA DE OSTEOPATÍA DE MADRID



ESCUELA DE OSTEOPATÍA DE MADRID