



POSTURA Y CLASES ESQUELÉTICAS DE OCLUSIÓN

ÁNGULO POSTURAL DE ROCABADO




ANGULO POSTURAL DE ROCABADO




POSTURA Y CLASES ESQUELÉTICAS DE OCLUSIÓN

REFLEJO CÉFALO-OCULO-GIRO Y OCLUSIÓN DENTAL




Los músculos hioideos son igualmente flexores del cuello y así pueden provocar una adaptación postural descendente.


TRASTORNOS ESTOMATOGNÁTICOS Y DESEQUILIBRIO POSTURAL



POSTURA Y CLASES ESQUELÉTICAS DE OCLUSIÓN



Clase III




Desequilibrio anterior
en caso de problema
oclusal sin
desequilibrio podal

Sin embargo, un problema podal está habitualmente asociado y puede modificar estas adaptaciones oclusales, ya que la influencia podal es más importante que la influencia oclusal.

También se puede observar en este caso adaptaciones posturales mixtas.

INFLUENCIAS DE LAS FUERZAS POSTURALES



POSTURA Y CLASES ESQUELÉTICAS DE OCLUSIÓN

DESEQUILIBRIO FACIAL




Clásico perfil de la clase 2 división 1



Asimetría facial

VISTA DE LA BOCA



Asimetría del paladar duro en extensión



Clase 2 división 1

POSTURA Y CLASES ESQUELÉTICAS DE OCLUSIÓN


TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO PODAL



VISTA DEL VALGO DE LOS CALCÁNEOS




VISTA DE LAS HUELLAS PLANTARES



POSTURA Y CLASES ESQUELÉTICAS DE OCLUSIÓN

POSTURA DE PERFIL CLASE 2 DIVISIÓN 1



- 1 – Línea central del cuerpo anterior.
- 2- Escapulum anterior.
- 3- Flecha cervical superior a la flecha lumbar lo que indica una posición anterior de la cabeza.
- 4- Flecha lumbar inferior a la flecha cervical.


DESEQUILIBRIO DE LAS CADENAS ANTEROPOSTERIORES



- Escapulum posterior con proyección anterior de la cabeza, hiperlordosis lumbar y cervical.


POSTURA Y CLASES ESQUELÉTICAS DE OCLUSIÓN

POSTURA DE ESPALDA CLASE 2 DIVISIÓN 1



- 1 – Desequilibrio lateral de la cabeza.
- 2 – Hombro más alto a la derecha.
- 3 – Báscula pélvica derecha.

DESEQUILIBRIO DE LAS CADENAS ANTEROPOSTERIORES Y LATERALES



Escapulum posterior con proyección anterior de la cabeza, hiperlordosis lumbar y cervical.

Se asocia un ligero desequilibrio lateral.