



Disfunción de las Fascias







La integridad del cuadro óseo y del tejido conjuntivo fascial no sólo son interdependientes sino que, de los mecanismos homeostáticos complejos, son las claves del funcionamiento normal del cuerpo.

Disfunciones de las Fascias

- *Inflamación*
- *Compresión o alargamiento de las raíces nerviosas*
⇒ *Dolor*
⇒ *Alteración de los influjos nerviosos*
- *Alteración del drenaje venoso*
- *Alteración del drenaje linfático*
- *Alteraciones locales de la nutrición y del metabolismo*
- *Limitación de los movimientos de las articulaciones vecinas*





- Las alteraciones del equilibrio de las cadenas miofasciales se acompañan de trastornos posturales:
 - Un desequilibrio anteroposterior se acompaña de un desequilibrio de las cadenas anterior y posterior.
Ejemplo: Un escapulum posterior se debe a la hipertonía de la cadena posterior y a la hipotonía de la cadena anterior.
 - Un desequilibrio lateral (escoliosis) se debe a un desequilibrio de las cadenas anterolateral y posterolateral.
- Su origen se encuentra en los trastornos de los captadores posturales (Pies, ojos y ligamento alveolodentales).
 - Por ejemplo, pueden existir tensiones en la aponeurosis prevertebral debidas a una disfunción somática cervical, que se puede extender a las diferentes fascias de la región (aponeurosis cervicales media y superficial, a las diferentes aponeurosis del miembro superior, del tendón central hacia las vísceras abdominales) y que puede producir restricciones de movilidad de los elementos densificados sobre los que se insertan, como la clavícula o la mandíbula.

- Estas tensiones fasciales pueden perturbar la fisiología de las diferentes glándulas (salivares, tiroides) a partir de sus plexos neurovegetativos locales.




Disfunciones Músculo-Esqueléticas



Una disfunción músculo-esquelética va a repercutir sobre el órgano a través de la fascia, provocando un éstasis vascular y un circuito reflejo nociceptivo medular.

ALTERACIÓN EN EL INTERCAMBIO DE LOS FLUIDOS


- Alteraciones metabólicas
- Alteraciones circulatorias
- Alteraciones en el drenaje venoso



Las fijaciones ligamentosas se producen como consecuencia de la PTOSIS visceral, en relación con cambios de la postura y del sistema hormonal.



Escapulum Anterior



Escapulum Posterior

Las modificaciones posturales responsables de la hipotonía de los músculos abdominales asociadas a la congestión visceral, causan la ptosis de las vísceras por aumento de la presión intraabdominal. El diafragma costal estará espasmado y ocupará una posición más baja. El periné, de igual manera, ocupará una posición baja.

ALTERACIONES CRANEALES:

- *Posición de los huesos*
- *Arteriales o venosas*
- *Pares craneales*

