

DIAGNÓSTICO

ANAMNESIS

ANTECEDENTES:

- ✓ Del nacimiento: malposición del feto, presentación patológica de la cabeza del niño durante el nacimiento, parto con fórceps o ventosa, cesárea.
- ✓ Traumatismos (choques, secuelas de fracturas de la fosa anterior o del macizo facial).
- ✓ Enfermedades infecciosas o inflamatorias (sinusitis, rinitis).

SIGNOS CLÍNICOS:

En relación con los lóbulos frontales, alteraciones de:

- ✓ la motricidad voluntaria,
- ✓ la conciencia, alteraciones intelectuales y de la expresión,
- ✓ el carácter: agitación, inestabilidad, insomnio
- ✓ signos en relación con el córtex fronto-orbitario neurovegetativo.

En relación con los nervios, alteraciones de:

- ✓ el nervio olfativo (I): hiposmia o anosmia,
- ✓ el nervio nasal interno (rama del V1): dolores frontales,
- ✓ el nervio supraorbitario (rama del nervio frontal que proviene del nervio oftálmico V1): dolores del ojo y de la órbita.
- ✓ el nervio lacrimal (rama del V1),
- ✓ el nervio motor ocular común (III) en su salida por la hendidura esfenoidal: movilidad del ojo,
- ✓ estrabismo,
- ✓ el nervio motor ocular interno (IV) y el motor ocular externo (VI).

Huesos de la órbita: hipermetropía, miopía.

Alteraciones vasculares:

- ✓ cefaleas frontales,
- ✓ migrañas congestivas.

Alteraciones membranas: tensión de la hoz del cerebro.

Alteraciones de los senos: sinusitis.

INSPECCIÓN

FORMA DE LA BÓVEDA CRANEAL:

- ✓ Abombada o aplanada (extensión o flexión).
- ✓ Diámetro antero-posterior.

FORMA Y POSICIÓN DEL FRONTAL:

- ✓ Prominencia o depresión de la sutura metópica.
- ✓ Posición de la protuberancia frontal de un hemifrontal con respecto al otro: anterior / posterior, superior / inferior, desplazada a la derecha o izquierda.
- ✓ Posición de los pilares interno y externo de un hemifrontal con respecto al otro.
- ✓ Tamaño de las órbitas y de los globos oculares.

RADIOLOGÍA:

Signos de sinusitis frontal.


PALPACIÓN

FORMA DE LAS EMINENCIAS FRONTALES:

- ✓ Prominentes: extensión.
- ✓ Borradas: flexión.

INDICADORES DOLOROSOS:

- ✓ Palpación de los puntos triggers de las suturas: coronal, fronto-maxilar, fronto-malar, fronto-nasal, fronto-etmoidal, y de los puntos pterion y bregma.
- ✓ Palpación de todos los huesos de la bóveda.



ESPASMOS DEL HAZ ANTERIOR DE LOS MÚSCULOS TEMPORALES.

LIBRO DE REFERENCIA:

François Ricard. Tratado de osteopatía craneal : análisis ortodóntico. Diagnóstico y tratamiento manual de los síndromes craneomandibulares. Panamericana 2005.