

LA PELVIS FEMENINA



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional


LA PELVIS FEMENINA

Diámetros de la Pelvis



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional


DIÁMETROS DE LA PELVIS



- Conjugado anatómico va desde el promontorio sacro al borde superior del pubis. Mide 11,5 cm.
- Conjugado obstétrico: Desde el promontorio sacro, hasta el punto más próximo del pubis. Mide 11 cm.
- Conjugado diagonal: Desde el promontorio sacro al borde inferior del pubis; está situado fuera del estrecho superior. Miide 12,5 cm.

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional


DIÁMETROS DE LA PELVIS



- Diámetro transverso anatómico que une los puntos más separados de las líneas innominadas midiendo 13 cm.
- Diámetro transverso obstétrico, equidistante de promontorio y pubis, que mide 12 cm.
- Diámetros oblicuos que van de la eminencia ileopectínea de un lado a la articulación sacroilíaca del otro, miden unos 12,5 cm.

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

DIÁMETROS DE LA PELVIS




Diámetros del estrecho inferior

- Diámetro transverso o biisquiático: Une las tuberosidades isquiáticas. Mide 11 cm.
- Diámetro transverso subpubocoxígeo: desde el borde inferior del pubis al vértice del cóccix. Mide 9 cm.

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

DIÁMETROS DE LA PELVIS




Diámetros anteroposteriores de la pelvis


Este diámetro puede ampliarse hasta 11 cm, al ser rechazado el cóccix por la cabeza fetal durante el parto.

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional


DIÁMETROS DE LA PELVIS




GINECOIDE
50%




ANDROIDE
20%




ANTROPOIDE
15%





PLATIPELOIDE
5%





Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional














Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional


MECÁNICA DE LA PELVIS EN EL PARTO

Los planos paralelos de Hodge sirven para saber la altura a la que se encuentra la presentación fetal durante el parto.

- Primer plano: el que pasa por el borde superior del pubis y el promontorio sacro (coincide con el plano superior del estrecho superior).
- Segundo plano: paralelo al anterior, pasa por el borde inferior del pubis (su parte posterior alcanzaría una altura correspondiente al borde inferior de S2).
- Tercer plano: paralelo a los anteriores, pasa por las espinas ciáticas.
- Cuarto plano: paralelo a los anteriores, pasa por el vértice del cóccix.

Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

MECÁNICA DE LA PELVIS EN EL PARTO



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional