
ALTERACIONES INTESTINALES



Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional



INVAGINAVIÓN INTESTINAL

Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

INVAGINACIÓN INTESTINAL

Introducción de una porción del intestino dentro del segmento del mismo inmediatamente distal.

De etiología ideopática en el 92% de los casos, es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y 6 años.

Puede provocarse en:

- La unión yeyuno-ileal.
- La válvula ileo-cecal.
- El colón.

Escuela Osteopatía de Madrid Internacional


INVAGINACIÓN INTESTINAL

Introducción de una porción del intestino dentro del segmento del mismo inmediatamente distal.

De etiología ideopática en el 92% de los casos, es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y 6 años.

Puede provocarse en:

- La unión yeyuno-ileal.
- La válvula ileo-cecal.
- El colón.



Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

INVAGINACIÓN INTESTINAL

Síntomas:

Niño eutrófico, que comienza con:

- Dolor abdominal tipo cólico.
- Sangrado, puede ser visto hasta en el 95 % de los casos
- Ileo: ausencia de eliminación de gases y materia fecal en el 93 %.
- En el 7 % restante puede presentar diarrea con sangre: heces en jalea de grosellas.

Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

INVAGINACIÓN INTESTINAL

Síntomas:

Niño eutrófico, que comienza con:

- Dolor abdominal tipo cólico.
- Vómitos 80 %.
- Sangrado, puede ser visto hasta en el 95 % de los casos
- Ileo: ausencia de eliminación de gases y materia fecal en el 93 %.
- En el 7 % restante puede presentar diarrea con sangre: heces en jalea de grosellas.

Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

INVAGINACIÓN INTESTINAL

Diagnóstico:

- Sintomatología.
- Exploración.
- RX de abdomen.
- Ecografia.
- Colon por enema con contraste hidrosoluble o neumático (puede ser terapéutico por reducción).

Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional



DISQUECIA

Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

DISQUECIA

Es una alteración del funcionamiento del intestino del lactante, que provoca:

- Dificultad para expulsar gases por vía anal.
- Dificultad para defecar.
- Ritmo intestinal lento que impide la defecación diaria, sin cambios en la consistencias de las heces.


Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

DISQUECIA

Sintomas:

- Cuando le bebé intenta defecar o expulsar gases:
  - Empujes abdominales que se identifican por un sonido característico.
  - Se pone rojo.
  - Dolor (llanto) que cede cuando consigue.

Escuela Osteopatía de Madrid Internacional



ESTREÑIMIENTO

Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

DISQUECIA

Es una alteración del funcionamiento del intestino del lactante, que provoca:

- Dificultad para defecar.
- El bebé se pasa varios días sin defecar.
- Las heces tienen una consistencia más espesa (tipo pasta de dientes).

Escuela Osteopatía de Madrid Internacional



AEROCOLIA

Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

LA AEROCOLIA

Conocido comúnmente como cólicos del lactante, es el acúmulo de aire en el intestino.


El neonato puede presentar síntomas relacionados con la afección intestinal o con el RGE y regurgitaciones, dado que la presión en el abdomen puede ser la causa de estas dos afecciones gástricas.

Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

LA AEROCOLIA

Sintomas:

- Abdomen en tonel.



Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

LA AEROCOLIA

Sintomas:

- Abdomen en tonel.



Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

LA AEROCOLIA

Sintomas:


- Abdomen en tonel.
- Crisis de llanto.
- En las crisis el bebé tiende a flexionar los miembros inferiores y el abdomen.

Se puede acompañar de alteraciones de:

- Alteraciones de la defecación.
- Síntomas gastricos,



Escuela Osteopatía de Madrid Internacional



DIAGNÓSTICO DE LAS ALTERACIONES INTESTINALES

Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

ALTERACIONES INTESTINALES

Diagnóstico:

- Diagnostico diferencial por la clinica.
- En la disquecia y el estreñimiento y la aerocolia se encuentra:
  - En la inspección - > distensión abdominal
  - Percusión -> abdómen timpánico.
  - Palpación -> tensión en el colón.



Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

¡Gracias!

Síguenos en redes

eominternacional.com I escuelaosteopatiamadrid.com