LESIONES EN EL PARTO OIIA




Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

“El parto es una experiencia única para cada mujer, nadie te podrá decir como será el tuyo”

Verena Schmid

“El parto es una experiencia única para cada Bebé.
Los osteópatas debemos intentar comprender sus consecuencias”




ACABALGAMIENTOS FISIOLÓGICOS


Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

ACABALGAMIENTOS DEL PARTO OIIA

Desde la posición transversa (OIIT), el feto realiza una rotación izquierda de 45º, colocándose en OIIA, que puede provocar:



- El ala iliaca presiona la parte posterior del parietal derecho que se acabalga por debajo del occipital.
- El promontorio sacro presiona la parte lateral del parietal izquierdo que se acabalga sobre le parietal derecho.





Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

ACABALGAMIENTOS DEL PARTO OIIA

Desde la posición transversa (OIIT), el feto realiza una rotación izquierda de 45º, colocándose en OIIA, que puede provocar:

- Presiones de los huesos indicados desde la posición anterior.
- El promontorio sacro presiona la parte anterior del hemifrontal izquierdo acabalgándose por debajo del parietal izquierdo.






Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

ACABALGAMIENTOS DEL PARTO OIIA

Desde la posición transversa (OIIT), hasta la posición OP, se pueden provocar los siguientes acabalgamientos:




- Parietal derecho debajo del occipital.
- Parietal izquierdo debajo del parietal derecho.
- Hemifrontal izquierdo debajo del parietal izquierdo.

Estos acabalgamientos pueden considerarse fisiológicos y desaparecerán unos días después del parto, por la presión centrífuga que ejerce el encéfalo.

Cuando se mantienen se consideraran lesiones.

Escuela Osteopatía de Madrid Internacional




LESIONES EN EL PARTO OIIA

Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

LESIONES EN EL PARTO OIIA

Para pasar de la posición OIIT a OIIA, además de la rotación izquierda, el feto realiza una ligera lateroflexión contraria (asinclitismo), que puede provocar:




- Acabalgamiento del parietal derecho por debajo del occipital.
- Lesión de rotación de la escama del occipucio a la derecha —> lesión intraósea del temporal.
- Acabalgamiento del parietal izquierdo por debajo del parietal derecho.

Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

LESIONES EN EL PARTO OIIA

Para pasar de la posición OIIT a OIIA, además de la rotación izquierda, el feto realiza una ligera lateroflexión contraria (asinclitismo), que puede provocar:

- Acabalgamiento del parietal derecho por debajo del occipital.
- Lesión de rotación de la escama del occipucio a la derecha —> lesión intraósea del temporal.
- Acabalgamiento del parietal izquierdo por debajo del parietal derecho.




Osteopatía de Madrid Internacional

LESIONES EN EL PARTO OIIA

Para pasar de la posición OIIT a OIIA, además de la rotación izquierda, el feto realiza una ligera lateroflexión contraria (asinclitismo), que puede provocar:

- Presión sobre el ala del esfenoides a la izquierda, provocando un lateral strain derecho más una imbricación de la sutura en “L” fronto-esfenoidal.
- Acabalgamiento del hemifrontal izquierdo sobre el parietal izquierdo.



Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

LESIONES EN EL PARTO OIIA

Para pasar de la posición OIIT a OIIA, además de la rotación izquierda, el feto realiza una ligera lateroflexión contraria (asinclitismo), que puede provocar:

- Presión sobre el ala del esfenoides a la izquierda, provocando un lateral strain derecho más una imbricación de la sutura en “L” fronto-esfenoidal.
- Presión lateral sobe el hemifrontal izquierdo que se acabalga debajo del derecho.
- Acabalgamiento del hemifrontal izquierdo sobre el parietal izquierdo.

Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

LESIONES EN EL PARTO OIIA

Desde la posición OP se podrían provocar las siguientes lesiones:


- Compresión de las suturas de la base:
  - Petroyugular.
  - Esfenopetrosa.
  - Esfenlobasilar

Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

LESIONES EN EL PARTO OIIA

Desde la posición OP hasta el desprendimiento de la cabeza se produce una flexión de la cabeza al pasar por la sínfisis del pubis, seguida de un extensión, que puede provocar:

- Imbricación de la sutura occipito-mastoidea.
- Lesión anterior de C_0 anterior a la derecha.



Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

LESIONES EN EL PARTO OIIA

En el movimiento de extensión cervical que se produce en el desprendimiento de la cabeza, el frontal empuja al coxis hacia la extensión, aumentando en 2 cm el diámetro subpubo-coxígeo.

Este movimiento se puede provocar:

- Presión sobre el frontal con imbricación de las suturas combas que se articula (huesos propios, maxilares , unguís y etmoides)
- Lesión de extensión o luxación del coxis materno.

Escuela Osteopatía de Madrid
Internacional

LESIONES EN EL PARTO OIIA

En parto OIIA desde la posición OIIT al desprendimiento de la cabeza, se pueden producir las siguientes lesiones

- Acabalgamiento de la sutura lambdoidea derecha (parietal).
- Acabalgamiento de la sutura sagital (parietal izquierdo).
- Acabalgamiento de la sutura coronal izquierda (hemifrontal).
- Acabalgamiento de la sutura metópica (hemifrontal izquierdo).
- Lesión de rotación de la escama del occipucio + ingraósea del temporal.
- Lateral strain derecho.

Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

LESIONES EN EL PARTO OIIA

En parto OIIA desde la posición OIIT al desprendimiento de la cabeza, se pueden producir las siguientes lesiones


- Imbricación de la sutura occipito-mastoidea derecha.
- Compresión de las suturas:
  - Petro-yugular. (+ derecha)
  - Esfeno-petrosa (+ derecha).
  - Esfeno-frontal (+ izquierda).
  - Fronto-etmoidal.

Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

LESIONES EN EL PARTO OIIA

En función de las posibles variaciones se pueden encontrar acabalgamientos en:

- Occipital derecho debajo del parietal.
- Parietal izquierdo debajo del occipital izquierdo.
- Hemifrontal izquierdo debajo del parietal izquierdo + hemifrontal derecho debajo del parietal derecho.
- Temporal izquierdo debajo del parietal izquierdo / parietal izquierdo debajo del temporal izquierdo.



Escuela Osteopatía de Madrid Internacional

¡Gracias!

Síguenos en redes

eominternacional.com I escuelaosteopatiamadrid.com