INSPECCIÓN

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

DIAGNÓSTICO OSTEOPÁTICO NEONATAL



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional



INSPECCIÓN


Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional


INSPECCIÓN DEL NEONATO

- Aspecto de la cabeza.
- Morfología facial: posición de las orejas, forma de los ojos, nariz, labios, mandíbula, paladar.
- Posición de la cabeza: tortícolis.
- Posición y movilidad de los MMSS.
- Posición de la columna.
- Forma y movilidad del tórax.
- Forma y movilidad del abdomen
- Posición y movilidad de las caderas. PLiegues glúteos, etc.
- Forma de las rodillas.
- Forma de las tibias.
- Posición y forma de los pies..

INSPECCIÓN DEL NEONATO

- Aspecto de la cabeza.
- Morfología facial: posición de las orejas, forma de los ojos, nariz, labios, mandíbula, paladar.
- Posición de la cabeza: tortícolis.







INSPECCIÓN DEL NEONATO

- Aspecto de la cabeza.
- Morfología facial: posición de las orejas, forma de los ojos, nariz, labios, mandíbula, paladar.
- Posición de la cabeza: tortícolis.
- Posición y movilidad de los MMSS.



INSPECCIÓN DEL NEONATO

- Aspecto de la cabeza.
- Morfología facial: posición de las orejas, forma de los ojos, nariz, labios, mandíbula, paladar.
- Posición de la cabeza: tortícolis.
- Posición y movilidad de los MMSS.
- Posición de la columna.



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

INSPECCIÓN DEL NEONATO

- Aspecto de la cabeza.
- Morfología facial: posición de las orejas, forma de los ojos, nariz, labios, mandíbula, paladar.
- Posición de la cabeza: tortícolis.
- Posición y movilidad de los MMSS.
- Posición de la columna.
- Forma y movilidad del tórax.
- Forma y movilidad del abdomen





Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

INSPECCIÓN DEL NEONATO





- Forma y movilidad del tórax.
- Forma y movilidad del abdomen
- Posición y movilidad de las caderas. Pliegues glúteos, etc.

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

INSPECCIÓN DEL NEONATO







- Forma y movilidad del tórax.
- Forma y movilidad del abdomen
- Posición y movilidad de las caderas. Pliegues glúteos, etc.
- Forma de las rodillas.
- Forma de las tibias.
- Posición y forma de los pies..

Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

INSPECCIÓN DEL NEONATO

- Aspecto de la cabeza.
- Morfología facial: posición de las orejas, forma de los ojos, nariz, labios, mandíbula, paladar.
- Posición de la cabeza: tortícolis.
- Posición y movilidad de los MMSS.
- Posición de la columna.
- Forma y movilidad del tórax.
- Forma y movilidad del abdomen
- Posición y movilidad de las caderas. Pliegues glúteos, etc.
- Forma de las rodillas.
- Forma de las tibias.
- Posición y forma de los pies..

EXPLORACIÓN DEL CRÁNEO

Hipertensión inducida por el Embarazo

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional



EXPLORACIÓN DEL CRÁNEO

Palpación

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

PALPACIÓN DEL CRÁNEO

Palpación de la bóveda:

- Fosa posterior, valorando:
  - La simetría / asimetría de ambos lados.
  - La simetría / asimetría de las eminencias occipitales inferiores.
  - La posición centrada de la protuberancia occipital externa.



Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

PALPACIÓN DEL CRÁNEO

Palpación de la bóveda:

- Parte lateral de la bóveda, valorando:
  - La simetría / asimetría de los diámetros antero-posteriores.
  - Posible concavidad / convexidad de la bóveda.
  - Posible asimetría del pterion y / o del asterion.





PALPACIÓN DEL CRÁNEO

Palpación de la bóveda:

- Fosa superior, valorando:
  - La simetría / asimetría de los diámetros antero-posteriores.
  - La simetría / asimetría de la altura de cada hemibóveda.
  - La simetría / asimetría de las eminencias parietales.

PALPACIÓN DEL CRÁNEO

Palpación de la bóveda:

- Parte anterior de la bóveda, valorando:
  - La simetría / asimetría de la escama de cada hemifrontal.
  - La simetría / asimetría de las eminencias frontales.





Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

PALPACIÓN DEL CRÁNEO

Palpación facial:

- La cara, valorando:
  - La simetría / asimetría de los huesos malares.
  - La simetría / asimetría de los huesos maxilares.
  - La simetría / asimetría de las ramas horizontales de la mandíbula.



Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

PALPACIÓN DEL CRÁNEO

Palpación de las suturas craneales:

- Se realizan pases longitudinales a la sutura para valorar su permeabilidad.

  En caso de craneosinostosis , ademas de la falta de separación de ambos huesos, se apreciará una cresta de un desarrollo irregular.
- Se realizan pases perpendiculares a la sutura para valorar posibles acabalgamientos.

PALPACIÓN DEL CRÁNEO

Palpación de las suturas craneales:







Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional



EXPLORACIÓN DEL CRÁNEO

Test de movilidad de la suturas

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DEL PIE

Movilidad global del cráneo:










Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DEL PIE

Movilidad de las suturas de la bóveda:

Movilidad de los huesos acabalgados:

- Con un apoyo en ambos huesos, se imprimirá una ligera presión sobre el hueso inferior seguido de un deslizamiento de ambos huesos.




Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DEL PIE


Movilidad de las suturas de la bóveda:

Movilidad de los huesos acabalgados:









Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DEL PIE

Movilidad de las suturas de la bóveda:



Occipito-mastoidea



Sagital



Fronto-esfenoidal






Esfeno-escamosa


Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

VALORACIÓN DEL PIE

Movilidad de las suturas de la bóveda:



Occipito-masgtoidea



Petro-basilar



Esfeno-escamosa



Esfeno petrosa

Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

VALORACIÓN DEL PIE

Movilidad de la SEB:



Toma de Uppleger




Toma a cinco dedos



Toma fronto-occipital



Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional




EXPLORACIÓN DEL CRÁNEO

Test de las lesiones intraóseas

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DEL PIE



Movilidad de la lesión intraóseas del occipucio:

En este test se va a realiza con un movimiento de supinación y de inclinación de la muñeca, por lo que hay que tener en cuenta que la biomecánica de la muñeca del terapeuta, podría condicionar el resultado. Por tanto:


- La mano craneal que abraza la escama del occipucio será la del lado hacia el que hay que movilizarla.



VALORACIÓN DEL PIE

Movilidad de la lesión intraóseas del occipucio:

- La mano craneal abraza la escama en posición vertical.
- Los dedos índice y pulgar de la mano caudal toman contacto con las eminencias occipitales inferiores (lo más cerca posible delas masas laterales):
- La mano caudal fija las masas laterales, la mano craneal moviliza la escama con un movimiento de supinación y ligera inclinación cubital.






VALORACIÓN DEL PIE

Movilidad de la lesión intraósea del esfenoides:

- La mano craneal toma contacto con índice y mayor en los arcos supraorbitarios, anular y pulgar en los pilares del frontal.






Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DEL PIE

Movilidad de la lesión intraósea del esfenoides:



- La mano craneal toma contacto con índice y mayor en los arcos supraorbitarios, anula y pulgar en los pilares del frontal.
- La mano craneal toma contacto con el pulgar y el índice (o mayor) en las alas del esfenoides.

Hay que evitar tapar lo ojos del bebé, permitiendo que pueda visualizar a su madre / padre.




Escuela de Osteopatia de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DEL PIE

Movilidad de la lesión intraósea del esfenoides:


- Los antebrazos en un plano horizontal (o el inferior en un plano vertical).
- Elevación de codos —> ángulo cerrado.
- Descenso de codos —> ángulo abierto.





Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DEL PIE



Movilidad de la lesión intraósea del temporal:

- La mano craneal toma un contacto con la escama del temporal.
- La mano caudal toma contacto con la pirámide petrosa (el dedo mayo por debajo de la porción timpánica del temporal, no se introduce en el conducto auditivo externo).
- La mano craneal moviliza la escama hacia anterior y hacia posterior.
- La mano caudal moviliza la pirámide hacia anterior y hacia posterior.
- Si la escama no va a posterior y la pirámide no va a anterior, el test es positivo.

EXPLORACIÓN DE LA COLUMNA Y PELVIS

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DE LA COLUMNA Y LA PELVIS

Movilidad vértebras cervicales



Movilidad C_0 - C_1



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DE LA COLUMNA Y LA PELVIS

Movilidad vértebras cervicales





Movilidad cervicales medias

VALORACIÓN DE LA COLUMNA Y LA PELVIS

Movilidad vértebras dorsales y lumbares







Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DE LA COLUMNA Y LA PELVIS

Movilidad Saco-iliaca en posición supina:



Movilidad iliaca



Movilidad sacra

Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

VALORACIÓN DE LA COLUMNA Y LA PELVIS

Movilidad Saco-iliaca en posición supina:






VALORACIÓN DE LA COLUMNA Y LA PELVIS

Movilidad Saco-iliaca en posición de rama:







EXPLORACIÓN DE LOS MMII

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional



EXPLORACIÓN LOS MMII


Valoración de la cadera

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DE LA CADERA

Inspección

- M.I. en aducción y R.I.
- Disminución de la movilidad de abducción y R.E.
- Asimetría del M.I. por afectación del muslo.
- La asimetría disminuye en flexión de caderas.
- Asimetría en la posición de las piernas.
- Asimetría en los pliegues de los muslos.
- Asimetría de los labios mayores en las niñas.
- Asimetría de los pliegues glúteos.






Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

VALORACIÓN DE LA CADERA

Test

- Ortolani.
- Balow






Escuela de Osteopatia de Madrid
Internacional


VALORACIÓN DE LA CADERA

Diagnóstico radiológico:

- H - Línea horizontal de Hilgenreiner que une los cartílagos irradiados.
- V - Línea vertical que pasa por la parte supero-externa del acetábulo.
- P -Línea de Perkins que pasa por el borde lateral del acetábulo. s positivo.



Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional




EXPLORACIÓN LOS MMII

Valoración de la Pierna

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DE LA TIBIA



Varo tibial fisiológico



Tibia vara

VALORACIÓN DE LA CADERA

Inspeccción:





Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional



EXPLORACIÓN LOS MMII

Valoración del pie

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

VALORACIÓN DEL PIE









¡Gracias!

Síguenos en redes

eominternacional.com I escuelaosteopatiamadrid.com